

beweka Kaninchenfutter

| | Rohprotein | Rohfaser | Ca | P | Na | Vitamin A | Vitamin D ₃ | Vitamin E | Vitamin C | org. Säuren | Aminosäuren | Kanigest-Konzept | Coccidiostatikum | Häsin | Absetzer | Masttiere | Zwergkaninchen Meerschweinchen Hamster |
|----------------------------------|------------|----------|------|------|------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|--|
| | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | I.E./kg | I.E./kg | mg/kg | mg/kg | | | | | Einsatzempfehlung | | | |
| ImmunKanin ^{(**)(1)(2)} | 16,0 | 18,5 | 1,10 | 0,60 | 0,22 | 12.000 | 1.000 | 100 | 505 | X | X | X | X | xxx | xxx | | |
| AktivKanin | 16,0 | 15,5 | 1,20 | 0,60 | 0,22 | 12.000 | 1.000 | 50 | 50 | | | | | xx | | xx | |
| BasicKanin | 16,5 | 16,0 | 1,00 | 0,55 | 0,20 | 12.000 | 1.000 | 50 | 50 | X | X | | | xx | x | xxx | |
| ZuchtKanin | 17,0 | 16,5 | 1,10 | 0,60 | 0,22 | 12.000 | 1.000 | 100 | 50 | X | X | | | xxx | xx | xx | |
| CocciKanin ⁽²⁾ | 16,0 | 15,5 | 1,00 | 0,55 | 0,20 | 12.000 | 1.000 | 50 | 50 | X | X | | X | xx | xx | xx | |
| AromKanin | 16,5 | 16,5 | 0,90 | 0,60 | 0,20 | 12.000 | 1.000 | 100 | 503 | X | X | | | x | xx | x | xxx |
| MiniKanin | 16,5 | 15,0 | 0,90 | 0,60 | 0,25 | 12.000 | 1.000 | 100 | 2.998 | | X | | | | | | xxx |

Stand: 10/2022 Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die jeweilige Deklaration!

(**) Spezialstarterfutter für Jungkaninchen zum sicheren Absetzen von der Häsin

(1) ab der 2. Säugewoche (vor der ersten Futteraufnahme der Jungkaninchen) bis zu 6 Wochen nach dem Absetzen an die Absetzer verfüttern

(2) Futter mindestens 5 Tage vor der Schlachtung absetzen

